

ร่วมกัน...ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

ระยะการตั้งครรภ์ที่ลื้นสุดก่อน 37 สัปดาห์ หรือที่เรียกว่า “คลอดก่อนกำหนด” ส่งผลให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะสำคัญของร่างกายตั้งแต่ใน娘 พ่างรายอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการศิริปักษ์เมื่อโตขึ้น



ปอดและเปลี่ยนออกซิเจนไม่ได้
ก่อช่องท่อหายใจ

เส้นเลือดไปปิดล็อกคลอด

เลือดออกในโพรงส่อง

ถ่ายเส้น

หัว ศีดเสื่อมแรง

การป้องกันการคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์สามารถทำได้ด้วย ดังนี้

มาฝึกครรภ์ตามนัดทุกครั้ง
เพื่อค้นหาความเสี่ยง



ดูแลความสะอาด
ร่างกายทุกวัน



ไม่ควรขับรถจักรยานยนต์ หรือ
นั่งรถเดินทางเป็นระยะเวลานาน



ควรนอนหลับให้เพียงพอ
และห้ามลากผ้าม่านระหว่างวัน



รับประทานอาหาร น้ำ
และยาตามคำแนะนำของแพทย์



หลีกเลี่ยงการอาบน้ำ หรือแช่น้ำ
ในบ่อที่มีน้ำไม่สะอาด



หลีกเลี่ยงการยกของหนัก



ควรเดินออกกำลังกาย
วันละ 30 นาที




ไม่ควรลื้นปัสสาวะ



ไม่ควรนั่งยองๆ หรือเปลี่ยน
จากท่าเริ่มเป็นท่าก้มบ่อยครั้ง



หลีกเลี่ยง หรือรีบเนคคัพองพันธ์
ที่ไม่ควรทบทวนหน้าท้อง



พบสัญญาณเตือน ให้รีบมาโรงพยาบาลทันที

- 1 ก้อนน้ำ ห้องแข็ง
- 2 มีน้ำใส่ลงในกระช่องคลอด
- 3 มีเลือดสีดองทางกระช่องคลอด
- 4 มีอาการ/เสียง/เสียงดังลงในกระช่องคลอด
- 5 ปัสสาวะเปลื้อง
- 6 หายใจลำบาก

หากมีสัญญาณเตือนก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ ให้เดินทางพบแพทย์ทันที ไม่ควรรอให้ถึงวันนัดฝากครรภ์